

Тестирование на наличие антител к ВИЧ необходимо пройти не только беременным женщинам, но и их половым партнерам.

При выявлении ВИЧ-инфекции во время беременности необходимо своевременно начать прием антиретровирусной терапии, которая дает возможность снизить риск передачи ВИЧ от матери ребенку.

При рождении ребенка от ВИЧ-положительной матери – исключить грудное вскармливание.

Получить дополнительную информацию по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции можно в отделе профилактики ВИЧ-инфекции и ПВГ Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

(г. Витебск,
ул. В.-интернационалистов, 37а)

телефоны:

+375 212 67 98 72

+375 212 48 08 08 (психолог)

e-mail: profaids@vitebsk.by



Я ЖДУ РЕБЕНКА

информация о ВИЧ-инфекции для будущих мам



Отдел профилактики ВИЧ-инфекции и ПВГ
ГУ «Витебский областной ЦГЭ и ОЗ»

ВИЧ-инфекция – хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), характеризующееся поражением иммунной системы.

ВИЧ передается:

- **При незащищенных половых контактах (без использования презерватива)**

У женщин выше риск заражения ВИЧ, по сравнению с мужчинами, из-за анатомических особенностей и более высокого содержания ВИЧ в сперме;

- **Через кровь**


при общем и повторном использовании шприцев, игл во время употребления наркотиков, пирсинга и нанесения татуировок;

- **От ВИЧ-положительной матери ребенку** во время беременности, родов и кормления грудью.



Повышают риск инфицирования ВИЧ:

- употребление любых видов наркотиков и алкоголя (под их действием снижается контроль над поведением и человек чаще вступает в незащищенные половые контакты);
- наличие инфекций, передаваемых половым путем;
- частая смена половых партнеров;
- половые контакты во время менструации.



ВАЖНО!

При планировании беременности оба будущих родителя должны пройти тест на наличие антител к ВИЧ.

При наступлении беременности женщине необходимо своевременно стать на учет в женскую консультацию, пройти обследование на ВИЧ инфекцию с кратностью, рекомендованной врачом.